エンボス

# 化学療法実施計画書（投与日程）

レジメン名＝胃癌TS-1+PTX[静脈内・腹腔内]【患者限定】

（対象疾病＝　　）

身　長＝＿＿＿＿cm
体　重＝＿＿＿＿kg
体表面積＝＿＿＿＿$m^2$
Ccr　＝＿＿＿＿

担当医

《初回開始日》　　年　　月　　日
今回〔　　〕クール目

| | 薬剤（商品名，一般名） | 1日投与量（ /$m^2$ or /kg） | 投与法 点静・静注 | 投与時間 (min) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS-1★ | 80mg/$m^2$ | 経口 | | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | パクリタキセル(PTX) | 50mg/$m^2$ | 点静 | 120 | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | パクリタキセル(PTX) | 20mg/$m^2$ | 腹腔内投与 | 60以上 | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 体表面積 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ★TS-1　1.25$m^2$未満 | 40mg×2回/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.25～1.5$m^2$未満 | 50mg×2回/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.5$m^2$以上 | 60mg×2回/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前投薬 | 5－$HT_3$拮抗薬 | 1A | 点静 | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | デカドロン | 6.6mg | 点静 | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ファモチジン | 20mg | 点静 | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ポララミン | 5mg | 点静 | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投与日程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 副作用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1クール期間 | 21日 | クール回数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 休薬期間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ☆予想される重篤副作用 | | アレルギー反応、末梢神経障害（主にPTX）<br>白血球減少、血小板減少、口内炎、色素沈着など（主に、TS-1） |
| | ☆副作用対策 | | 減量、アレルギーに対しては前投薬の強化 |
| | ☆実施中止条件 | 生化学項目<br>副作用<br>その他 | WBC＜2000（Seg＜1000）<br>強いアレルギー反応の出現 |

エンボス

# 化学療法実施計画書（投与日程）

レジメン名＝《1ｸｰﾙ目》胃癌CAP+HER【患者限定】

（対象疾病＝　　）

《初回開始日》　　年　　月　　日

今回〔　　〕ｸｰﾙ目

身　長＝＿＿＿＿cm

体　重＝＿＿＿＿kg

体表面積＝＿＿＿＿$m^2$

Ccr　＝＿＿＿＿

| 担当医 | |
|---|---|
| | |

| | 薬剤（商品名，一般名） | 1日投与量（ /$m^2$ or /kg） | 投与法 点静・静注 | 投与時間（min） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハーセプチン(HER) | 8mg/kg※ | 点静 | 90 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 《1ｸｰﾙ目》 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ゼローダ(CAP)：C法 | 2,000mg/$m^2$★ | 経口 | | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | (↓) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 体表面積 | | | | （ゼローダ内服：第1日目午後～15日目午前） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ★ｾﾞﾛｰﾀﾞ 1.36$m^2$未満 | 1,200mg×2回/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.36～1.66$m^2$未満 | 1,500mg×2回/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.66～1.96$m^2$未満 | 1,800mg×2回/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.96$m^2$以上 | 2,100mg×2回/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前投薬 | 5-$HT_3$拮抗薬 | | 点静 | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ラシックス | | 点静 | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | デキサメタゾン | | 点静 | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投与日程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 副作用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※2ｸｰﾙ目以降は6mg/kgで投与を行う。投与予定日より1週間を超えた後に投与する際は、改めて初回投与量の8mg/kgで投与を行う。
なお、次回以降は6mg/kgを3週間間隔で投与する。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1ｸｰﾙ期間 | 21日 | ｸｰﾙ回数 | 1 |
| | 休薬期間 | | | |
| | ☆予想される重篤副作用 | | 骨髄抑制、嘔気 | |
| | ☆副作用対策 | | 対症療法と減量又は休薬<br>手足症候群対策・・・保湿剤、ビタミンB6内服など | |
| | ☆実施中止条件 | 生化学項目<br>副作用<br>その他 | WBC＜3，000 （好中球＜2，000）<br>末梢神経障害、手足症候群 | |

エンボス

# 化学療法実施計画書（投与日程）

レジメン名＝《2ｸｰﾙ目以降》胃癌CAP+HER【患者限定】

（対象疾病＝　　）

《初回開始日》　　年　　月　　日

今回〔　　〕ｸｰﾙ目

身　長＝＿＿＿＿cm

体　重＝＿＿＿＿kg

体表面積＝＿＿＿＿$m^2$

Ccr　＝＿＿＿＿

| 担当医 | |
|---|---|
| | |

| | 薬剤（商品名，一般名） | 1日投与量（/$m^2$ or /kg） | 投与法 点静・静注 | 投与時間（min） | 1ｸｰﾙ投与スケジュール(日目) 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハーセプチン(HER) | 6mg/kg※ | 点静 | 90 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 《2ｸｰﾙ目以降》 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ゼローダ(CAP)：C法 | 2,000mg/$m^2$★ | 経口 | | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | (↓) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 体表面積 | | | | （ゼローダ内服：第1日目午後～15日目午前） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ★ｾﾞﾛｰﾀﾞ 1.36$m^2$未満 | 1,200mg×2回/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.36～1.66$m^2$未満 | 1,500mg×2回/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.66～1.96$m^2$未満 | 1,800mg×2回/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.96$m^2$以上 | 2,100mg×2回/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前投薬 | 5-$HT_3$拮抗薬 | | 点静 | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ラシックス | | 点静 | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | デキサメタゾン | | 点静 | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投与日程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 副作用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※2ｸｰﾙ目以降は6mg/kgで投与を行う。投与予定日より1週間を超えた後に投与する際は、改めて初回投与量の8mg/kgで投与を行う。
なお、次回以降は6mg/kgを3週間間隔で投与する。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1ｸｰﾙ期間 | 21日 | ｸｰﾙ回数 | |
| | 休薬期間 | | | |
| | ☆予想される重篤副作用 | | 骨髄抑制、嘔気 | |
| | ☆副作用対策 | | 対症療法と減量又は休薬<br>手足症候群対策・・・保湿剤、ビタミンB6内服など | |
| | ☆実施中止条件 | 生化学項目<br>副作用<br>その他 | WBC＜3，000 （好中球＜2，000）<br>末梢神経障害、手足症候群 | |

エンボス

# 化学療法実施計画書（投与日程）

レジメン名＝《1ｸｰﾙ目》胃癌TS-1+HER【患者限定】

（対象疾病＝　　）

《初回開始日》　　年　　月　　日

今回〔　　〕クール目

身　長＝＿＿＿＿cm
体　重＝＿＿＿＿kg
体表面積＝＿＿＿＿$m^2$
Ccr　＝＿＿＿＿

| 担当医 | |
|---|---|
| | |

| | 薬剤（商品名，一般名） | 1日投与量（/$m^2$ or /kg） | 投与法 点静・静注 | 投与時間（min） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハーセプチン(HER) | 8mg/kg※ | 点静 | 90 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 《1ｸｰﾙ目》 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | TS-1 | 80mg/$m^2$★ | 経口 | | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 体表面積 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ★TS-1　1.25$m^2$未満 | 40mg×2回/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.25～1.5$m^2$未満 | 50mg×2回/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.5$m^2$以上 | 60mg×2回/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前投薬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投与日程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 副作用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※2ｸｰﾙ目以降は6mg/kgで投与を行う。投与予定日より1週間を超えた後に投与する際は、改めて初回投与量の8mg/kgで投与を行う。
なお、次回以降は6mg/kgを3週間間隔で投与する。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1クール期間 | 21日 | クール回数 | 1 |
| | 休薬期間 | | | |
| | ☆予想される重篤副作用 | | 骨髄抑制、嘔気など<br>心障害、24時間以内に発現するInfusion　reaction（ハーセプチン） | |
| | ☆副作用対策 | | 制吐剤など | |
| | ☆実施中止条件 | 生化学項目<br>副作用<br>その他 | 重篤な骨髄抑制など | |

エンボス

# 化学療法実施計画書（投与日程）

レジメン名＝《2ｸｰﾙ目以降》胃癌TS-1+HER【患者限定】

（対象疾病＝　　）

《初回開始日》　　年　　月　　日

今回〔　　〕クール目

身　長＝＿＿＿＿cm
体　重＝＿＿＿＿kg
体表面積＝＿＿＿＿$m^2$
Ccr　＝＿＿＿＿

| 担当医 | |
|---|---|
| | |

| | 薬剤（商品名，一般名） | 1日投与量（/$m^2$ or /kg） | 投与法 点静・静注 | 投与時間（min） | 1クール投与スケジュール(日目) 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハーセプチン(HER) | 6mg/kg※ | 点静 | 90 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 《2ｸｰﾙ目以降》 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | TS-1 | 80mg/$m^2$★ | 経口 | | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 体表面積 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ★TS-1　1.25$m^2$未満 | 40mg×2回/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.25～1.5$m^2$未満 | 50mg×2回/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.5$m^2$以上 | 60mg×2回/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前投薬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投与日程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 副作用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※2ｸｰﾙ目以降は6mg/kgで投与を行う。投与予定日より1週間を超えた後に投与する際は、改めて初回投与量の8mg/kgで投与を行う。
なお、次回以降は6mg/kgを3週間間隔で投与する。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1クール期間 | 21日 | クール回数 | |
| | 休薬期間 | | | |
| | ☆予想される重篤副作用 | | 骨髄抑制、嘔気など<br>心障害、24時間以内に発現するInfusion　reaction（ハーセプチン） | |
| | ☆副作用対策 | | 制吐剤など | |
| | ☆実施中止条件 | 生化学項目<br>副作用<br>その他 | 重篤な骨髄抑制など | |

エンボス

# 化学療法実施計画書（投与日程）

レジメン名＝《1ｸｰﾙ目》胃癌SOX+HER【患者限定】

（対象疾病＝　　）

《初回開始日》　　年　　月　　日

今回〔　　〕ｸｰﾙ目

身　長＝＿＿＿＿cm
体　重＝＿＿＿＿kg
体表面積＝＿＿＿＿$m^2$
Ccr　＝＿＿＿＿

| 担当医 | |
|---|---|
| | |

| | 薬剤（商品名，一般名） | 1日投与量（/$m^2$ or /kg） | 投与法 点静・静注 | 投与時間（min） | 1ｸｰﾙ投与スケジュール(日目) 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハーセプチン(HER) | 8mg/kg※ | 点静 | 90 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 《1ｸｰﾙ目》 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | エルプラット(ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ) | 130mg/$m^2$ | 点静 | 120 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TS-1 | 80mg/$m^2$★ | 経口 | | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 体表面積 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ★TS-1　1.25$m^2$未満 | 40mg×2回/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.25～1.5$m^2$未満 | 50mg×2回/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.5$m^2$以上 | 60mg×2回/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前投薬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投与日程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 副作用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※2ｸｰﾙ目以降は6mg/kgで投与を行う。投与予定日より1週間を超えた後に投与する際は、改めて初回投与量の8mg/kgで投与を行う。
なお、次回以降は6mg/kgを3週間間隔で投与する。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1ｸｰﾙ期間 | 21日 | ｸｰﾙ回数 | 1 |
| | 休薬期間 | | | |
| | ☆予想される重篤副作用 | | 骨髄抑制、嘔気など<br>心障害、24時間以内に発現するInfusion　reaction（ハーセプチン）<br>末梢神経障害、手足症候群 | |
| | ☆副作用対策 | | 制吐剤など | |
| | ☆実施中止条件 | 生化学項目<br>副作用<br>その他 | 重篤な骨髄抑制など<br>WBC＜3，000　（好中球＜2，000）<br>末梢神経障害、手足症候群 | |

エンボス

# 化学療法実施計画書（投与日程）

レジメン名＝《2ｸｰﾙ目以降》胃癌SOX+HER【患者限定】

（対象疾病＝　　）

《初回開始日》　　年　　月　　日

今回〔　　〕クール目

身　長＝＿＿＿＿cm
体　重＝＿＿＿＿kg
体表面積＝＿＿＿＿$m^2$
Ccr　＝＿＿＿＿

| 担当医 | |
|---|---|
| | |

| | 薬剤（商品名，一般名） | 1日投与量（/$m^2$ or /kg） | 投与法 点静・静注 | 投与時間（min） | 1クール投与スケジュール（日目） 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハーセプチン(HER) | 6mg/kg※ | 点静 | 60 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 《2ｸｰﾙ目以降》 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | エルプラット(ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ) | 130mg/$m^2$ | 点静 | 120 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TS-1 | 80mg/$m^2$★ | 経口 | | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 体表面積 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ★TS-1　1.25$m^2$未満 | 40mg×2回/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.25～1.5$m^2$未満 | 50mg×2回/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.5$m^2$以上 | 60mg×2回/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前投薬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投与日程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 副作用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※2ｸｰﾙ目以降は6mg/kgで投与を行う。投与予定日より1週間を超えた後に投与する際は、改めて初回投与量の8mg/kgで投与を行う。
なお、次回以降は6mg/kgを3週間間隔で投与する。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1クール期間 | 21日 | クール回数 | |
| | 休薬期間 | | | |
| | ☆予想される重篤副作用 | | 骨髄抑制、嘔気など<br>心障害、24時間以内に発現するInfusion　reaction（ハーセプチン）<br>末梢神経障害、手足症候群 | |
| | ☆副作用対策 | | 制吐剤など | |
| | ☆実施中止条件 | 生化学項目<br>副作用<br>その他 | 重篤な骨髄抑制など<br>WBC＜3，000　（好中球＜2，000）<br>末梢神経障害、手足症候群 | |

エンボス

# 化学療法実施計画書（投与日程）

レジメン名＝《1ｸｰﾙ目》胃癌XELOX+HER【患者限定】

（対象疾病＝　　）

《初回開始日》　　年　　月　　日

今回〔　　〕ｸｰﾙ目

身　長＝＿＿＿＿cm
体　重＝＿＿＿＿kg
体表面積＝＿＿＿＿$m^2$
Ccr　＝＿＿＿＿

| 担当医 | |
|---|---|
| | |

| | 薬剤（商品名，一般名） | 1日投与量（/$m^2$ or /kg） | 投与法 点静・静注 | 投与時間（min） | 1ｸｰﾙ投与スケジュール(日目) 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハーセプチン(HER) | 8mg/kg※ | 点静 | 90 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 《1ｸｰﾙ目》 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | エルプラット(ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ | 130mg/$m^2$ | 点静 | 120 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ゼローダ(CAP)：C法 | 2,000mg/$m^2$★ | 経口 | | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | (↓) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 体表面積 | | | | （ゼローダ内服：第1日目午後～15日目午前） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ★ｾﾞﾛｰﾀﾞ 1.36$m^2$未満 | 1,200mg×2回/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.36～1.66$m^2$未満 | 1,500mg×2回/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.66～1.96$m^2$未満 | 1,800mg×2回/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.96$m^2$以上 | 2,100mg×2回/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前投薬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投与日程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 副作用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※2ｸｰﾙ目以降は6mg/kgで投与を行う。投与予定日より1週間を超えた後に投与する際は、改めて初回投与量の8mg/kgで投与を行う。
なお、次回以降は6mg/kgを3週間間隔で投与する。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1ｸｰﾙ期間 | 21日 | ｸｰﾙ回数 | 1 |
| | 休薬期間 | | | |
| | ☆予想される重篤副作用 | | 骨髄抑制、嘔気<br>心障害、24時間以内に発現するInfusion reaction（ハーセプチン）<br>末梢神経障害、手足症候群 | |
| | ☆副作用対策 | | 対症療法と減量又は休薬、制吐剤など<br>手足症候群対策・・・保湿剤、ビタミンB6内服など | |
| | ☆実施中止条件 | 生化学項目<br>副作用<br>その他 | 重篤な骨髄抑制など<br>WBC＜3，000 （好中球＜2，000）<br>末梢神経障害、手足症候群 | |

エンボス

# 化学療法実施計画書（投与日程）

レジメン名＝《2ｸｰﾙ目以降》胃癌XELOX+HER【患者限定】

（対象疾病＝　　）

《初回開始日》　　年　　月　　日

今回〔　　〕ｸｰﾙ目

身　長＝＿＿＿＿cm
体　重＝＿＿＿＿kg
体表面積＝＿＿＿＿$m^2$
Ccr　＝＿＿＿＿

| 担当医 | |
|---|---|
| | |

| | 薬剤（商品名，一般名） | 1日投与量（/$m^2$ or /kg） | 投与法 点静・静注 | 投与時間（min） | 1ｸｰﾙ投与スケジュール(日目) 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハーセプチン(HER) | 6mg/kg※ | 点静 | 60 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 《2ｸｰﾙ目以降》 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | エルプラット(ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ) | 130mg/$m^2$ | 点静 | 120 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ゼローダ(CAP)：C法 | 2,000mg/$m^2$★ | 経口 | | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | (↓) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 体表面積 | | | | （ゼローダ内服：第1日目午後～15日目午前） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ★ｾﾞﾛｰﾀﾞ 1.36$m^2$未満 | 1,200mg×2回/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.36～1.66$m^2$未満 | 1,500mg×2回/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.66～1.96$m^2$未満 | 1,800mg×2回/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.96$m^2$以上 | 2,100mg×2回/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前投薬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投与日程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 副作用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※2ｸｰﾙ目以降は6mg/kgで投与を行う。投与予定日より1週間を超えた後に投与する際は、改めて初回投与量の8mg/kgで投与を行う。
なお、次回以降は6mg/kgを3週間間隔で投与する。

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1ｸｰﾙ期間 | 21日 | ｸｰﾙ回数 |
| | 休薬期間 | | |
| | ☆予想される重篤副作用 | | 骨髄抑制、嘔気<br>心障害、24時間以内に発現するInfusion reaction（ハーセプチン）<br>末梢神経障害、手足症候群 |
| | ☆副作用対策 | | 対症療法と減量又は休薬、制吐剤など<br>手足症候群対策・・・保湿剤、ビタミンB6内服など |
| | ☆実施中止条件 | 生化学項目<br>副作用<br>その他 | 重篤な骨髄抑制など<br>WBC＜3，000 （好中球＜2，000）<br>末梢神経障害、手足症候群 |