エンボス

化学療法実施計画書（投与日程）

レジメン名＝《2ｸｰﾙ目以降》乳癌CAP+HER

（対象疾病＝　　）

《初回開始日》　　年　　月　　日

今回〔　　〕ｸｰﾙ目

身　長＝＿＿＿＿cm
体　重＝＿＿＿＿kg
体表面積＝＿＿＿＿m^2
Ccr　＝＿＿＿＿

担当医	

	薬剤（商品名，一般名）	1日投与量（/m^2 or /kg）	投与法 点静・静注	投与時間（min）	1ｸｰﾙ投与スケジュール(日目) 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ハーセプチン《2投目以降》	2mg/kg	点静	60	↓							↓							↓						↓								
2	ゼローダ（CAP）：A法 体表面積	1,650mg/m^2★	経口		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								
	★ｾﾞﾛｰﾀﾞ 1.31m^2未満	900mg×2回/日																														
	1.31～1.64m^2未満	1,200mg×2回/日																														
	1.64m^2以上	1,500mg×2回/日																														
前投薬																																
投与日程																																
副作用																																

	1ｸｰﾙ期間	28日	ｸｰﾙ回数	
	休薬期間			
	☆予想される重篤副作用	ハーセプチン	心障害，24時間以内に現れるInfusion reaction	
		ゼローダ	手足症候群（hand-foot syndrome）	
	☆副作用対策	ハーセプチン	・心機能評価（心エコー、MUGAスキャン） ・初回は入院してInfusion reaction に関して観察する。	
		ゼローダ	手足症候群対策：保湿クリーム(1日5回)、ビタミンB6(60mg/day連日投与)、減量、休薬	
	☆実施中止条件	生化学項目 副作用 その他		