エンボス

化学療法実施計画書（投与日程）

レジメン名＝乳癌CAP+VNR

（対象疾病＝　　）

《初回開始日》　　年　　月　　日

今回〔　　〕クール目

身　長＝＿＿＿＿cm

体　重＝＿＿＿＿kg

体表面積＝＿＿＿＿m^2

Ccr　＝＿＿＿＿

担当医	

	薬剤（商品名，一般名）	1日投与量（/m^2 or /kg）	投与法 点静・静注	投与時間（min）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ゼローダ（CAP）：A法	1,650mg/m^2★	経口		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																
2	ナベルビン（VNR）	25mg/m^2	点静	10min以内	↓							↓							×															
	生食　50mL																																	
	体表面積																																	
	★ゼローダ 1.31m^2未満	900mg×2回/日																																
	1.31～1.64m^2未満	1,200mg×2回/日																																
	1.64m^2以上	1,500mg×2回/日																																
前投薬	5-HT_3拮抗薬	1A	点静		↓							↓																						
	デキサメタゾン	6.6mg	点静		↓							↓																						
	生食	250mL	点静	60	↓							↓																						
投与日程																																		
副作用																																		

	1クール期間	21日	クール回数
	休薬期間		

☆予想される重篤副作用	ナベルビン	骨髄抑制（白血球・好中球）、静脈炎
	ゼローダ	手足症候群（hand-foot syndrome）、肝障害
☆副作用対策	ナベルビン	＊静脈炎（特徴的副作用）→出来るだけ太い静脈から10分以内で投与。その後補液で洗い流す。
	ゼローダ	手足症候群対策：保湿クリーム(1日5回)、ビタミンB6(60mg/day連日投与)、減量、休薬
☆実施中止条件	生化学項目 副作用 その他	