

化学療法実施計画書（投与日程）

レジメン名 = 食道癌TS-1+DOC【患者限定】

(対象疾病 = _____)

身長 = _____ cm

体重 = _____ kg

体表面積 = _____ m²

Ccr = _____

担当医	

《初回開始日》 _____ 年 _____ 月 _____ 日

今回 [_____] クール目

薬剤 (商品名, 一般名)	1日投与量 (/m ² or /kg)	投与法 点静・静注	投与時間 (min)	1クール投与スケジュール(日目)																													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1 タキソテル(DOC:トセタキセル)	40mg/m ²	点静	60以上	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
2 TS-1 (* 略語DOC=TXT) 体表面積	80mg/m ² *	経口	↗	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
★TS-1	1.25m ² 未満 1.25~1.5m ² 未満 1.5m ² 以上			↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
前投薬 5-HT ₃ 拮抗薬 デキサメタゾン	1A 3.3~6.6mg	点静 点静		↓	↓																												
投与日程																																	
副作用																																	
1クール期間	21日	クール回数																															
休薬期間																																	
☆予想される 重篤副作用		白血球減少、好中球減少、口内炎、貧血、食欲不振																															
☆副作用対策		G-CSF投与、減量。																															
☆実施中止条件	生化学項目 副作用 その他	Cr>2.0、WBC<2,000																															